

Sorteneinstufung Frühljahrsaussaat 2025

Sorteneinstufung nach der Beschreibenden Sortenliste Bundessortenamt, Irrtümer vorbehalten.



Sommerweizen

Sorte	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Ährenfusarium	Mehltau	Gelbrost	sonst. Blattkrankheiten	Fallzahlstabilität	Rohprotein-gehalt	TKG
KWS Carusum E	mittel	mittel-lang	mittel	gering-mittel	gering	sehr gering-gering	gering-mittel	sehr hoch	hoch	hoch
KWS Expectum E	mittel	mittel	mittel	gering-mittel	gering	sehr gering-gering	gering-mittel	hoch	hoch	mittel
Saludo E	mittel	lang-sehr lang	mittel-hoch	mittel	mittel	gering	gering-mittel	sehr hoch	sehr hoch	mittel
Sonett E	mittel	mittel	gering-mittel	mittel-stark	gering-mittel	sehr gering-gering	mittel	mittel-hoch	hoch	niedrig-mittel
Telimena A	mittel	mittel	gering-mittel	gering-mittel	gering-mittel	gering-mittel	gering-mittel	mittel-hoch	mittel	hoch
Zenon E	mittel-spät	mittel	gering	gering-mittel	gering-mittel	gering-mittel	gering-mittel	hoch	sehr hoch	gering-mittel

Hafer

Sorte	Bespelzung	Rispen-schieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Hektolitergewicht	Spelzenanteil	TKG
Ivory	weiß	früh	früh-mittel	mittel	mittel	mittel-stark	mittel	mittel-hoch	niedrig	sehr hoch
Karl	gelb	früh-mittel	mittel	mittel	mittel	gering-mittel	sehr gering	hoch	sehr gering-gering	mittel
Kaspero	gelb	früh-mittel	mittel	mittel-lang	mittel	mittel	gering	mittel-hoch	gering	gering-mittel
Kertag	gelb	-	mittel-spät	mittel	gering	-	mittel	mittel-hoch	-	mittel
Lion	gelb	mittel	mittel	gering-mittel	gering	gering-mittel	mittel	hoch	sehr gering-gering	mittel
Max	gelb	früh-mittel	mittel	kurz-mittel	mittel	mittel-stark	mittel	hoch	sehr gering-gering	mittel
Platin	gelb	früh-mittel	früh-mittel	mittel	mittel	gering-mittel	gering	hoch	gering	mittel-hoch
Rambo Züchtereinstufung	gelb	mittel	mittel	mittel-lang	mittel-hoch	-	gering	hoch	gering	mittel-hoch
Talkunar	unbespelzt	früh-mittel	mittel	sehr lang	mittel	mittel	gering-mittel	-	-	sehr gering-gering

Sommergerste

Sorte	Qualitätsgruppe	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Zwergrost	Netzflecken	Rhynchosporium	TKG
Amidala	Braugerste	mittel	kurz-mittel	gering-mittel	gering-mittel	mittel	sehr gering-gering	mittel	gering-mittel	gering-mittel	hoch
Avalon	Braugerste	mittel	kurz-mittel	gering	gering-mittel	mittel	mittel-stark	gering	mittel-stark	mittel-stark	mittel
Pirona	Nacktgerste	früh-mittel	mittel-lang	stark	stark	gering-mittel	sehr gering-gering	-	gering-mittel	-	gering
RGT Planet	Futtergerste	früh-mittel	kurz-mittel	mittel	mittel	mittel	sehr gering-gering	gering-mittel	mittel	gering-mittel	mittel
Tolstefix	Braugerste	früh-mittel	mittel-lang	gering-mittel	mittel	mittel	mittel-stark	gering-mittel	mittel	mittel	mittel

Sommertriticale

Sorte	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Gelbrost	Braunrost	Mehltau	Blattseptoria	Ährenfusarium	TKG
Mamut	früh-mittel	mittel	kurz-mittel	sehr gering-gering	gering	gering	gering	gering-mittel	gering	gering-mittel
Mazur	früh-mittel	mittel-spät	mittel	gering-mittel	gering-mittel	gering	gering	mittel	gering-mittel	mittel
Toristo	früh-mittel	mittel	mittel-lang	mittel	sehr gering-gering	-	mittel	mittel	gering-mittel	mittel-hoch

Sorteneinstufung Frühjahrssaussaat 2025

Sorteneinstufung nach der Beschreibenden Sortenliste Bundessortenamt, Irrtümer vorbehalten.



Sommerroggen

Sorte	Ähren-schieben	Reife	Pflanzen-länge	Lager-neigung	Halm-knicken	Braun-rost	Rhyncho-sporium	Mehltau	Fallzahl-stabilität	TKG
Arantes	mittel	mittel	kurz-mittel	mittel-hoch	-	mittel	-	-	mittel-hoch	mittel
SU Vergil	mittel	mittel	mittel	mittel-hoch	-	mittel	-	-	mittel-hoch	mittel

Ackerbohnen

Sorte	Blüh-beginn	Reife	Pflanzen-länge	Lager-neigung	Brennflecken	Botrytis	Rost	Rohprotein-ertrag	Tanningehalt	TKG	Bemerkung
Apollo	früh-mittel	mittel	mittel-lang	sehr gering-gering	mittel	gering-mittel	mittel	hoch	vorhanden	mittel-hoch	-
Birgit	früh-mittel	mittel	mittel-lang	gering-mittel	-	-	mittel-hoch	hoch	vorhanden	mittel-hoch	-
Stella	früh-mittel	mittel	mittel-lang	gering-mittel	mittel	gering-mittel	mittel	hoch-sehr hoch	vorhanden	mittel-hoch	-
Tiffany	früh-mittel	mittel	mittel-lang	sehr gering-gering	mittel	gering-mittel	mittel	hoch	vorhanden	mittel-hoch	vicin-/convicinarm
Trumpet	mittel	mittel	mittel-lang	sehr gering	mittel	gering-mittel	mittel-hoch	hoch	vorhanden	mittel	-

Lupinen

Sorte	Typ	Blüh-beginn	Reife	Pflanzen-länge	Lager-neigung	Blüten-farbe	Typ	Rohprotein-gehalt	TKG
Boregine	Blaue Lupine	früh	mittel	kurz-mittel	mittel	weiß	Verzweigung	mittel	mittel-hoch
Boruta	Blaue Lupine	früh-mittel	mittel	kurz	mittel	violett	endständig	mittel	mittel
Frieda	Weißer Lupine	früh	mittel	mittel	gering	bläulichweiß	Verzweigung	mittel	hoch
Lunabor	Blaue Lupine	früh	mittel	kurz-mittel	mittel	violett	Verzweigung	mittel	gering-mittel

Erbsen

Sorte	Blüh-beginn	Blüh-dauer	Reife	Pflanzen-länge	Lager-neigung	Typ	Kornfarbe	Rohprotein-gehalt	TKG
Alvesta	früh-mittel	kurz-mittel	früh	mittel-lang	gering	halbblattlos	gelb	hoch	mittel-hoch
Astronaut	früh-mittel	mittel	früh-mittel	mittel-lang	gering	halbblattlos	gelb	sehr hoch	mittel-hoch
Eso Züchtereinstufung	früh-mittel	mittel	mittel-spät	mittel	gering	halbblattlos	gelb	mittel	gering
Ingrid	-	-	-	lang	gering	halbblattlos	gelb	-	-
Respect	früh-mittel	kurz-mittel	früh-mittel	lang	sehr gering-gering	halbblattlos	gelb	mittel-hoch	mittel
Salamanca	früh-mittel	mittel	früh-mittel	lang	gering	halbblattlos	gelb	-	mittel-hoch
Symbios	früh-mittel	mittel	früh-mittel	mittel-lang	gering	halbblattlos	gelb	mittel-hoch	mittel-hoch